



Herbicyd nalistny, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, samosiewów zbóż i innych chwastów jednoliściennych (po ich wzejściu) w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych i sadowniczych w okresie wegetacji.

Skład:

chizalofop-P-etylowy – 10%

Sposób działania

Pilot 10 EC wykazuje działanie układowe. Pobierany jest bardzo szybko przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów.

Działanie środka na chwasty widoczne jest po upływie około 7 dni od opryskiwania i objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści. Pełny efekt jest widoczny po około 2-3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody. Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają ich skuteczności.

Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.

Zalecenia stosowania

Zwalczane chwasty:

jednoroczne: samosiewy zbóż, owies głuchy, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, palusznik krwawy, włośnica sina i zielona, wyczyniec polny, życie.

wieloletnie: perz właściwy, wiechlina zwyczajna, wiechlina olbrzymia.

Dawka:

chwasty jednoroczne:

- samosiewy zbóż: **0,35-0,4 l/ha**,
niższą dawkę stosować do początku fazy krzewienia
- pozostałe gatunki, np. chwastnica jednostronna, owies głuchy: **0,4-0,5 l/ha**,
wyższą dawkę stosować w czasie krzewienia i po krzewieniu chwastu

chwasty wieloletnie:

- perz właściwy: **1-1,5 l/ha**,
wyższą dawkę stosować, gdy wykonano uproszczoną uprawę i rozłogi perzu nie zostały pocięte

Środek Pilot 10 EC należy stosować nalistnie po wejściu chwastów w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów:

- **chwasty jednoroczne** – od fazy 2 liści do początku krzewienia,
- **perz właściwy** – w fazie 4-6 liści.

Burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne)

Opryskiwać, gdy buraki wytworzą pierwszą parę liści do momentu, gdy rośliny zakryją nie więcej niż 50% międzyrzędzi.

Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków, środki stosować na 10 dni przed przerywką lub w 10 dni po przerywce, gdy chwasty prosoвате pojawią się ponownie.

Rzepak ozimy

Opryskiwać jesienią, gdy rzepak wykształci co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną nie później niż do początku wybijania rzepaku w pędy.

Środek Pilot 10 EC można stosować w obniżonych dawkach łącznie z adiuwantami:

- do zwalczania samosiewów jesienią w dawce:
Pilot 10 EC 0,25-0,3 l/ha + Atpolan 80 EC 1 l/ha lub Olejan 85 EC 1 l/ha
- do zwalczania perzu jesienią w dawce:
Pilot 10 EC 0,75 l/ha + Atpolan 80 EC 1 l/ha lub Olejan 85 EC 1 l/ha
- do zwalczania perzu wiosną w dawce:
Pilot 10 EC 0,75l/ha + Atpolan Bio 80 EC 1 l/ha

Uwagi

- W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Pilot 10 EC (np. w wyniku wymarznienia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny, w których środek zaleca się stosować lub inne rośliny dwuliścienne. Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania środka Pilot 10 EC.
- Nie stosować środka, gdy temperatura powietrza przekracza 27°C.
- Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać mechanicznej uprawy przez okres 1 miesiąca.